

作物名	適用場所	適用雑草名	適用時期	使用量/10a当り		本剤の 使用回数	グリホサートを含む 農薬の総使用回数		
				薬量(ml)	希釈水量(L)				
果樹類 (かんきつを除く)	-	一年生雑草	収穫 7 日前まで ・雑草生育期・	250～500	通常散布 50～100	3 回以内	3 回以内		
かんきつ		多年生雑草		500～1000	100		5 回以内		
		マルバツユクサ		1000～2000					
		スギナ		2000					
		一年生雑草	250～500	通常散布 50・100					
	多年生雑草	500～1000	少量散布 25～50						
水田作物 (水稲を除く)	水田畦畔	一年生雑草	耕起 20～10 日前まで ・雑草生育期・	250～500	50～100	1 回	2 回以内		
移植水稲			は種 30 日前～出芽前 ・雑草生育期・ ・乾田耕起栽培・		50	2 回以内			
直播水稲			収穫 14 日前まで ・雑草生育期・	500～1000		3 回以内			
水田作物 (水田畦畔)		多年生雑草							
水田作物 (水田刈跡)		水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250～500	50～100	1 回	1 回	
		多年生雑草	500～1000						
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草	250～500		500～1000		3 回以内		
		多年生雑草	500～1000						
豆類 (稲実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	-	一年生雑草	耕起前又はは種前まで ・雑草生育期・	250～500	少量散布 25～50	2 回以内	2 回以内		
だいず			は種 10 日以前 ・雑草生育期・				100	1 回	1 回
			は種後出芽前まで ・雑草生育期・						
野菜類 (だいこん、えだまめ、ねぎ、たまねぎ、トマト、きゅうり、 なす、ほうれんそう、レタス、アスパラガス、オリーブ(葉)、 しゃくやく(薬用)、たらきのき、びわ(葉)、にんじん、 ピーマン、とうがらし類、薬用にんじんを除く)			耕起 7 日前まで ・雑草生育期・						
えだまめ			は種後出芽前 ・雑草生育期・	少量散布 25～50	3 回以内	3 回以内			
ねぎ			耕起 7 日前まで ・雑草生育期・	100					
			収穫 14 日前まで ・雑草生育期・ 定植後畦間処理	少量散布 25～50					
			耕起 7 日前まで ・雑草生育期・	100					
たまねぎ			耕起又は定植 7 日前まで ・雑草生育期・	50～100					
トマト、きゅうり、なす、ほうれんそう レタス、アスパラガス、オリーブ(葉) しゃくやく(薬用)、たらきのき、びわ(葉)				100					
だいこん、にんじん、ピーマン、とうがらし類				100	1 回	2 回以内			
薬用にんじん				耕起 7 日前まで ・雑草生育期・		10 回以内 (1 年間に 2 回以内)			
麦類 (小麦を除く)						3 回以内	3 回以内		
小麦			多年生雑草	500～750	50～100	1 回			
雑穀類							2 回以内		
いも類 (かんしょを除く)		一年生雑草	耕起前又は植付前まで ・雑草生育期・	100		1 回			
かんしょ			耕起前 ・雑草生育期・						
飼料用とうもろこし		一年生及び 多年生雑草	耕起前又はは種前まで ・雑草生育期・ は種後出芽前まで ・雑草生育期・	50～100	2 回以内	2 回以内			
さとうきび	圃場内の 周縁部	一年生雑草	収穫 30 日前まで ・雑草生育期・	500～1000	少量散布 25～50	1 回	6 回以内		
		多年生雑草							
茶	-	一年生雑草	摘採 7 日前まで ・雑草生育期・	250～500			2 回以内		
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	多年生雑草	更新・造成の 10 日以前 ・雑草生育期・	500～1000	50	2 回以内	3 回以内		
		一年生及び 多年生雑草	は種 10 日前～は種当日 ・雑草生育期・ ・耕起整地後・ ・雑草発生前期・	250～500					
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類等の 多年生雑草 落葉雑草かん木	生育盛期以降 ・夏～秋期・	1000	30	1 回	1 回		
樹木類	-	一年生雑草	雑草生育期	250～500	50～100	4 回以内	4 回以内		
樹木等	公園、庭園、 堤とう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面、 鉄道 等	多年生雑草		500	100	3 回以内	3 回以内		
				1000					
			スギナ		2000	50～100			

希釈倍率

長く、確実な除草効果

所定の時期と倍率で散布すれば、
一年生雑草から多年生雑草、
ススキ・ササ類まで根まで枯らします。

基本的な雑草

100倍液

- ・イネ科雑草
- ・スズメノカタビラ
- ・ギシギシ

等

頑固な雑草

50倍液

- ・セイタカアワダチソウ
- ・ツユクサ・クズ
- ・イタドリ・クログワイ
- ・ドクダミ・セリ
- ・オオバコ・タンポポ

等

スギナ

25倍液

ササ

30倍液

※ 適用作物毎に希釈倍率は異なります。

水量	サンフーロン®の量			広さ
	100倍	50倍	25倍	
5ℓ	50ml	100ml	200ml	30坪
10ℓ	100ml	200ml	400ml	60坪
20ℓ	200ml	400ml	800ml	120坪
50ℓ	500ml	1ℓ	2ℓ	300坪
100ℓ	1ℓ	2ℓ	4ℓ	600坪



ご使用の際は製品ラベル記載の
「適用作物と使用方法」をよくご確認の上、
ご使用下さい。

使用上の注意事項などについては、製品に
貼付されているラベルをご参照下さい。

サンフーロン お客様相談窓口

ご質問、
お問い合わせは



☎ 0120-014-052

🌐 [http:// sunfulon.jp/](http://sunfulon.jp/)

ご家庭、農家のみなさまをサポートします

TAISEI

NOZAI

大成農材株式会社

広島県広島市
中区鉄砲町 7-8

農を通して豊かな暮らしを

taiseinozai.co.jp/

作物名	適用場所	適用雑草名	適用時期	希釈倍率	使用液量	使用方法	本剤の使用回数	グリホサートを含む農薬の総使用回数
林木	林地	クス・フジ等の つる類	生育初期	原液 又は 2 倍液	つる径 2cm以下 0.5ml / 株 2.1~3.0 1.0 3.1~4.0 1.5 4.1~5.0 2.0 5.1cm 以上 適宜増量	つる注入 処理	1 回	1 回
		落葉雑草かん木	生育期 (5~10月)		樹径 10cm以下 1ml / 力所 10~20cm 2~3 力所 20cm 以上 4~8 10	立木注入 処理		
	林地 放置竹林	竹類	夏期	原液	5~10ml / 本	竹稈注入 処理		
		雑草						